

三

農

紀

三農經卷之三

古蜀

張宗弘師古市

小引

萬理得於天非地不能賜一靈賦於人非物不能生
物因人而生人受物而成兩相得與爲三

太古時無粒食飲血茹毛神農氏始嘗炒別穀以教民
執軒轅氏教以蒸飴周官有五穀六穀九穀之名詩人有
八穀百穀之詠素問云五穀爲養麻麥稷黍豆以配五臟
周禮職方氏辨土九州之穀地官辨土宜種植之種以教
稼穡樹藝皆所以重民命也周禮太宰以九職任萬民曰
三農平地典農澤農山農三農生九穀黍稷秬秠粱

三才圖會卷之三
蔬是也說文云穀者善也穀以養人較蔬爲切要爾雅翼
云粱者黍稷之總名菽者衆豆之總名禾者漑穀之總名
三穀各二十蔬果各二十是爲首穀金八波家周書云慎地
必爲之圖以齊其物別其善惡度其宜以卜利其陂溝受其
農時修其等列務其土實則是矣

鋤荒

先以利刃刈剝草木排列首尾整齊待乾趁大晴風順發
火焚之或種油蘇或種芝蔴一季使無根腐敗然後鋤去
根柢縱橫犁耕人牛兩便不致損力理蒔無蕪害之患物
理論云芝蔴之于炒木猶鉛錫之于五金也性可制耳

耕田

田未耕曰生已耕曰熟初耕曰場再耕曰轉生者欲凍而
猛熟者欲廉而淺春耕宜遲遲者取春動寒氣肅地脈
治通秋耕宜早早者起天氣未寒將陽和之氣掩在土內
來春苗茂春氣透十脈通可耕堅土強地黑墾土輟土磨
其塊刈草草生復耜及逢小雨復耕和之勿令有土塊以
待時所謂強以弱之杏始華輒輕耕弱土望杏花落後復
耕草生有雨澤耕里耨之土甚堅者馬牛踐之所謂弱以
強之

黃田

土有厚薄田有美惡得人之營可化惡爲美假糞之力可
變薄爲厚以生生之土歲歲種之不得糞助土疲氣衰則

生長難茂農夫必儲糞以育之則土力精壯而收穫必倍
此子輿氏所謂百畝之糞止農夫食九人也然土壤氣腥
其類不一肥沃饒確美惡不同而相治之法各有其宜黑
壤性美矣然過糞不有官得上以解之則苗茂而實堅饒
确性惡矣仗糞力滋培則苗長而實收上性雖異須治得
其宜悉可植而種齊民要術云美田之法菜豆爲上小豆
胡麻次之悉皆五六月礪種六七月犁掩刈之每畝倍收
其與蚕矢同較熟其勝

積糞

一積地莫如積糞地多糞少枉費人工須于秋收場土所
小穰穰等並須收停一處每日畜牛馬欄內二三寸厚糞宿

使成糞收聚除積堆積每日亦如前法至春可得糞三十車餘移干場厰翻篩極細每畝用五車勻攤收子可勝于常者六畝○一草木藥盛時芟倒就地待日曬半乾有移所處拖罨腐爛故記云仲夏之月利以芟草可以肥田又將所耘鋤之草掘穴深瘞田中漚化亦可肥田又可除草江南三月草長刈以踏秋田歲歲若此故土力常盛吳地剗山草茅皮治糞歲穫不斂○一冬時收腐藥敗草雜枯朽根壞亥及棄葉堆焚之令烟出勿見火久焚成糞灰勿移川便溺澆灌趁天晴翻覆再灌○一禽獸之毛羽甚是肥澤若能收積之爲糞勝于他糞百倍三角收積爲法治灰亦過常糞○一溝港內淤泥以搬撥上岸日晒凝定

成塊同大糞和用比常糞力倍○一魚塘近宅停水處內
有淤泥其性清涼甚宜蔬宜未于春初放乾水透岸上晒
乾入糞甚佳○一農居之側必置糞爲簍極以辟雨驅
浸屋中當鑿深池墊瓦以磚石須用石灰封固勿使浸漏凡
掃除塵土灰化陳批落葉積而焚之沃以肥液積久乃多
移出篩去瓦礫礮爲細末以備播種○一厨棧下深鑿一
坑以磚石細甃不致滲漏上蓋以木板棚架留以便所每
鯪壳灰化漚漬其中滌器肥水與滲漚滑澆漚自然腐爛
一歲三四出漚蔬澆芋飲桑更茂○一欲計置糞須用一
人一牲駕車一輛諸處搬運得一人捫一据于各路揀收
拾矢日八月深積少成多

占種

欲知來歲宜穀冬至日平旦諸子種用袋囊盛之埋陰處
冬至後五十日發起量之息最多歲所宜種○神農占穀
法云五時見生而樹生見死而獲死師曠云五木者五穀
之先欲知五穀先視五木擇其木盛者來年多種之萬不
失一古書云禾生于棗或楊大麥生于杏小麥生于桃和
生于柳或楊黍生于榆大豆生于李麻生于荆或楊五木
自天生五穀待人生五穀候十五木故生而樹生也靡草
死麥秋至草木黃落木乃登故曰先死而獲死也蒔種各
有依敘能得時宜不違先後之序則相繼以生盛

種子

凡子種溫濕者則難生生亦尋死若種傷濕溫者生虫子
種雜綜不純者苗生早晚不齊復減難熟宜存意擇揀美
種及純色者貯之及種時先半月之前晒乾極燥令馬就
穀處踐之令馬食數口不遭野蝗又法以十二月三九中
臘雪水漬之耐旱少虫○上旬種者上收中旬種者中收
下旬種者下收良田宜晚種薄田宜早種良田非獨宜晚
早亦無害薄田種晚必不成山田宜強苗勁禾以耐風雪
澤田宜弱苗疎莖以求華實神契云黃土宜禾黑壤宜麥
赤土宜粟汙泉宜稻因土性之宜

種法

漫種先計地畝之寬狹畝土之肥瘦然後定其子種之

大小或豆或麥務要布種均勻以筐盛子夾在腋下右手
抖而揚之隨撒隨行齊民要術云凡種要平遲緩行人得
以足跟隴底欲土實易生也惟土高石磽處宜之○一耨
種法以木造似斗形上大下小中藏一機在內撥于下自
三竅順胛下子上口添子耨則三犁地三行耨胛隨犁
落子牛行人搖量畝計子不致苗有稠稠秘之患今農家制
種車隨耨種子後循隴碾過使根土相着功力甚速惟平
夷處宜之○一點種先審田之大小酌子種之多少以灰
簍拌和子種均勻以牛淺耕成行種人以左手腕提簍子
以右手撮子簍勺點犁溝中或七八寸一科或尺許隨足
掩土蓋之此法易于耨鋤不畏暴雨凡山陵陂坳難耕處

須以右手鑿土左手點子當將子種盛袋裝繫頸土垂于胸
前隨鑿隨點苗生稀稠得宜又易鋤○一瓠種法以瓠
鑽多竅子盛瓢中隨行隨搖而種之須稠秘得所以犁捲
過覆土既深暴雨不致挺捷且耐旱使耘○一區種凡出
坡近邑高危傾陵皆可爲區田糞種小澆以備旱災區長
丈餘廣三尺鑿起宿土以雜草火燎之免虫患益以糞土
將子納子區上候苗生視稠秘去留旱以水澆澆以溝引
治蔬蒞者宜○一芽種法以子先用水淘洗頓盆中土覆
以溫艸二日後芽生然後下種先以熟畦內以水微澆
芽種後篩細糞覆之以防日暘此法苗易生齊艸又生
惟治園者宜之若有虫蠹以苦參根泡水澆石底水澆酒

苗上

耘苗

以少鋤爲良勿以無州而暫停及時鋤苗且滋茂又且
旱而真堅若惰而遲耘必爲草薶苗不滋茂實不堅重
而耨之功助苗之長大矣

收穫

實時至卽黃收穫不宜過老太老禾則折節早則色裂若
逢大雨功損其平必趁天晴刈收不致雨淋濕泥實亦佳
美葉亦鮮明

麥

麥圖經云苗似韭如稻高二三尺春深抽莖苗土五節空

心方穗實藏壳內芒生壳外生青熟實穗左右分合一種
每十倉一倉包三粒其六十粒者其年三粒者上收二
粒者中收一粒者下收又有倉不及數者曰荒有兩岐者
爲瑞秋種夏獲種有早中晚三等品有有芒無芒兩樣色
有白赤紫粒有圓長扁其類甚多各地化氣說文云天降
瑞麥象芒刺之形如足行來故字從來從父覓書云白麥
師鎔字與五作秣詩云貽我來牟來其其實父象其根也
秋種厚狸謂之麥俗稱小麥者粒形也麥者脹也食之可
以養其穀也

耕麥地注大生意云中伏中五更時趁露未乾陽氣在下
耕之人得其涼牛得其快先作地所喜或種麥曰

之屬候苗開花結角墾

翻大地勝于着糞此之謂種屬法

種國宜白露前後逢上戊

爲上時逢中戊爲中時逢下戊

爲下時種須揀成實無

雀麥野莖者宜節飯去草子及

秕蛀者得糲子油拌過

則無虫而耐旱大抵土欲肥耕

欲深耜欲數種欲勻以

灰糞蓋之喜糞愛雨出數寸

得雨乃佳若初種得大

雨則子搥撻難生小雨爲妙三

月兩麥收若三春微雨

人夏微風此麥大有之年

芸麥鋤麥惟春初間惟樓

種點種者可鋤麥未起身時以

三寸利刃鋤去豈豆

雀麥將土芸蓋麥苗留心遇春

雨倍長苗將老時以水

溉更佳

種麥護麥者防露傷也若

天下砂露用荻麻散銓長繩上

須浸晨令兩人對持其繩于麥亭拽去砂露則不傷麥
刈麥半黃帶青時刈一半合熟一半蓋麥熟同時不比
他禾熟有先後若候齊熟一遇風雨必拋撒刈遇起晴
即收須密加苫蓋趁晴急宜旋刈旋收旋打揚收起即
未淨候所收打遍將揩再打大抵農家之忙莫過麥蚕
若遷延渾時秋苗亦誤粒鋤故老農云收麥如救火
貯法太平御見云麥之生蠶由溼也萬物之變皆有化止
麥之化區以灰法于中伏內晒極乾趁熱收藏覆以石
灰則不生中又法和以蚕矢辟蠹或艾葉蒼耳剉碎同
收若少濕必生虫忌乙丑巳卯戊申巳丑口收貯忌虹
凡麥吐穗收漿時劈開麥實有紅虫如蛆者在穢穢間

過三日不見矣

本性麥味甘而氣溫素問云麥穀心類云云麥有浮厚屬
本許慎云屬金火旺而臧許以時鄭以形素問以功性
麥俱四時中和之氣兼寒暑溫涼之性受風露霜陽之
化繼絕續之爲利甚薄穀中之至貴者也春種至夏亦
收然不及秋種者但有小毒耳秋種亦有向陽之異南
方卑濕冬來少雪春時多雨麥受卑濕之氣不夜華食
之生熟腹痛難消且江淮宜魚稻河洛宜羊麥地氣使
然也故形同而性殊北者固佳陳者更良麩味甘氣
溫養氣不足補五臟麩味甘氣寒可慰風濕浮麥
益氣除熱止目汗骨蒸襍粉可去熱除毒麩飭解

熱和中素食要品油煎則熱 麥苗解酒疸消虫毒麥
中黑穢各奴王天行熱毒

効方小兒痘潰不能着蓆睡卧者用夾襖盛麩縫合籍取
性涼而軟治以麩淘淨其麩此誠妙法也

中暑者以生麩調水服之又止衄血吐血



接神契云王者德王
上為日月來為五穀
白馬神農作天錫嘉禾
同秀服同本異秀伊尹
六百里之禾為童信
上禾者仁卉也其大
之麥稠長而莖黑二
之者重食蠅先時者
次羊之者致香以息
以節後時者苗弱而
大麥

下地則嘉禾生傳云天地之精
蓋穀者民之所天而天之精華
禾九穗者得三十五穗以異本
尹稱南海之相而管仲書其君
口滋瑞雲云王者德澤而嘉禾
昭舍一野一禾一占貨云粉時
以爲行而服薄而赤色符
音雨本王賜勳即刻而多疾其
使人以且有力如此者不
應狼獲魚而美

大麥圖經云莖葉與秣相似但葉微大莖微粗色深青而
白粉傅芒長穗大壳粒相粘不易去脫止堪碾作粥食造
酒爲麴爲醬佳喂牛馬其良大麥者楚麥也大稞取家禾
未熟而先熟爲穀之長故得大名亦大也粒大于秣各
種而形類

種莠小麥不過冬大麥不過年此方言也極寒極溫之地
多種于春宜于種田豆地收後耕種或漫或耨或點隨
方隨人勤怠但冬則寒烏籍田打耗子種宜速種爲最
陰陽書云大麥生于春工百日秀秀復五十日成生于
亥旺于卯長于辰老于巳死于午惡于戌忌亥子日刈
穫收貯同小麥

本性天麥味甘而氣平涼寬中壯血為麪久服髮不白苗
河小便大麥芽味鹹氣溫子婦忌服食米汙則乳湧食
麥芽則乳收

効方冬月手面破家者米大麥葉煮湯洗之

典

物理論云麥本木氣遇金而熟麥本金氣逢火此登

此在天之氣屬陽也伏乎而少陰而華遇濕土而肥

是知天氣始下少陰百穀始生終于少陰百穀始熟

地氣始生少陰萬物發生終于少陰萬物歸根故云

常川者生失時者死○應璩國志嘉禾者五穀之長

也文者異本而同秀實者同本而異秀○漢書云范

丹有時種穀種窮居自若妻子以捨拾自資見常拾得

麥五斛雖人尹臺遺之一斛夫見不得過後

種麥

種麥圖經云麥莖長大如稗薺穗吐左子結枝傍芒莖

包粒收其子可爲麪爲殭麪能耐食和蜜可爲糕豐茂
苗飼牛馬甚良易肥故俗稱爲油麥山東河北秦巴多種
之穰有二種一種類大麥而粒小穰不連壳麪連壳大麥
與小麥穗類燕麥與穰麥穗類其功用不同而形亦異宜
山種不畏風寒穰者野穰之義其形穰也從廣者言其
易種廣收也

種穰理宜耕熟土秋冬種但冰寒之處在春動土融時種
之亦佳

本性穰味甘而氣溫暴食似動氣久食令人多力

効方送行者以之炒熟蜜和食耐饑

典故

方輿記云凡出征令兵健囊裝河沙袋藏炒麪遇危險地
方割其囊去沙可蹴澗健行絕糧則袋麪可以度飢

白濁可
以止渴

青稞

青稞葉類麴而深青穗類稊而子離壳苗青實圓故曰青
稞以其形實而名之也關中一種顆粒微小色微青而穗
以飼牛馬汴洛河北之處一種黃稞似小麥而粒大皮薄
多麴可春以粒食磨麴爲殭麴和蜜拌作路糧又釀酒甚
佳

植莠種與大麥同若冰寒之地宜三四月種六七月收類
土溫和之上而植者少爲其枯多實少也

本姓青稞味甘氣寒益脾潤肌



杜陽編云元祐大珍回貢碧麥形大于中華之麥麥
與白碧色香甚佳食之極甘可以禦寒風

麥出甘肅唐書云種麥似大麥出涼州

麥三月種八川敗蘭麥似小麥而粒狀大

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

荷麥

三尖蓬赤梗空四稜生節枝生左在開小

蘄蘿薺密結實垂懸棘三棧嶺青嶺亦

妙異于衆永在牛長箇牛闌花牛結子牛

失時而獲則孫爲祖。祖將生孫一名救方。

各花姿其形弱而趨易散曰藝曰栽者苗

磨經如麥故人麥品也

主極孰秋後以灰糞種之八月收春

收難據其種之時謹避其種之方溫平之

處食之多合 人病至于西北極寒之方以蕎食為天味

極美可麪可饊可羹可粉南人以實蒸熟開口又晒乾

搗米食

本性蓄味甘氣寒實腸益氣苗味酸寒瘧人以濕指卧病

厲灰汁人染色退油膩煉絲帛能制牛夏麻芋毒



南史曹景宗白美曰我少年時在鄉里遇蕎麥紅而黃

如饑渴時平澤中逢鹿我助射之謂飲其血而食其

乳不知老之將王今來馬州作貴人轉動不得時行

腹車慢小人輒言不可閉置斗中如三日之新婦此

惡邑使人

人我盡

蕎麥

晉書國經云藥可多枝葉如蒼而尖花帶綠色結實如

其色蒼而不黑 稻大而稜角不峭其味苦麴黃色山波處
廣種其收宜過 蕎麥豐年飼牛馬甚宜荒年可救饑

極種收與蕎同但蕎乃嬌翹之物不耐用淋淋則生芽
宜趁晴打撿收晒貯藏秋蒔者或拌以油菜子或同麥
同種及蕎收而麥菜亦茂不害其便爾蒔其時磨熟可
爲餅餌但氣味苦惡蒸使氣流滴去黃米色若猪肝和
蜜饈食甘美

本性苦薺味苦 氣寒有小毒涼血清燥多食傷胃發風
氣

効方 薺皮黑 豆皮 赤豆皮 決明子 菊花 作枕至老目不
暗

典文

負種傳歲

在金陵水毀木經火皇太歲後六歲早卜

俗李惺之

政次也所在精省自可均處使以流道後

民移樂又

從也或無焉殿座獨最下也古人處之詳

矣遺當自

廣昔禁片下下之穀于可產之地當歲歲

精以爲

醴之

如之物設遇御歉可能活命甚于萬此本

美

御麥

御麥圓經云

麥類麥高六七尺六七月開花吐穗節

側生葉腋生

苞苞微長類如紅纓絨狀苞內包實如楊

柳形五六寸許實外排列粒于纍纍然如芙蓉又有黑白

紅青之色有種有結花放于頂實生于節子結于外結藏

于內亦穀中之高者其經進御故曰御麥產于西咸曰世

麥麥者言磨麪如麥也粒可果可釀酒南人呼爲包果楚

人呼為芭麥河洛人呼為玉梁戎菽是也

種藝植宜山土三月耕種每科須三尺詩種二三粒苗出六七寸耨其草去其苗弱者留壯者一株三月萌八九月穫穫歸也以木架透風令乾宜在室中閉戶塞窓穀之不致耗濺再晒乾收貯

本性御麥味甘氣寒滿腸下氣多食令人冷滿

効方小便淋瀝御麥根煎湯服

興發

搜神記一人在山天中縛得樹子將歸援母自後悲鳴隨至其人傳子于庭樹老猿搏頰求哀竟擊殺之

援母悲鳴自斃而死破腹腸寸寸新殺一古者聞而如之嘆云人傷求生物傷生其間禍福兩相爭母殺因死兒援死激發惡心略善心求其形而瘞之自此退人事以訪道

稷

稷一名稌實可供祭也今人以稷呼粟呼穀以糜以聚呼
稷釋文云穀之有浮壳者爲粟粒實圓者爲粟孔子曰粟
之爲言續也粟乃六穀之總稱又古文作粟象穗在禾土
之形春秋題辨云粟爲金所立爲陽之精故西合禾爲粟
也鄭康成云粱稷也按祭祀之號稷曰明粱則粱又稷矣
古者以粟爲稷粱黍稷之總名矣之言粟者古爲粱矣後
人專以粱之細者爲粟粗者爲麻以不粘者爲粟以別稷
也齊民要術云粱爲稷黍之總名今河洛稱之曰穀江淮
稱之曰粟粒曰小米曰金米曰使米顛倒五混莫指類之
神農五穀者麻黍稷麥豆是也周禮六穀者黍稷稻粱麥
麻是也又九穀者稷粱麻麥稻粱苽大豆小豆是也西陽

雜記九穀者黍稷稻粱三豆二麥是也粟爲陸穀之總名
稻爲水穀之總名穀爲粟稻蔬果百穀之總名今以一禾
而兼稱粟穀之各正家亥之未別陶陰之不分耳陸種書
黍稷辨云稷之爲言粟無疑矣因丘定志雷禮一言而解
今古之惑訛稷者嬰也嬰從禾詩云憂嬰良耜言進力治
稼也稷乃另種穡如人冠其稷字象田中垂紉之形苗高
三四只似蜀黍稗空而有節細而矮葉若小蘆而有毛穗
似蒲而有毫稷粒成粒狀兆人日食不可缺之糧也成熟有
早晚苗幹有高下性質有強弱滋味有美惡其種甚多呼
名不一有粘不粘之別須順天時量地宜用刀少而成功
多在情反道則勞而無報

種藝士欲肥耕欲深謂欲細子須成實者簸去秕缺以膠雪水浸之仲春之雨爲妙小雨初按濕潤之氣大雨候按乾先相後種種後旋以石砣砣令土堅則苗出旺盛遇天旱苗出土仍砣春種宜深夏種宜淺旱禾晚禾宜兼種防歲有所宜干云閏年宜晚禾大旱宜旱早田拔多于晚早田淨而易治晚田無機難治且早穀米實而多晚穀米少而虛苗行宜疎疎則穗大來年任麥

耘鋤無度數以多爲妙第一遍曰撮苗二遍曰定科去其密者弱者留其壯者第三遍曰擁本鋤既深擁其之以護根則耐旱第四遍曰復壟俗名添米凡鋤以小鋤爲良苗出壟則深鋤不厭數周而復始勿以莠草而忌

功鋤非爲笑 農養取土孰而實多糠薄而米美鋤得十
遍可得八米春鋤起地夏鋤除草春鋤不得獨濕六月
以後雖濕亦不妨

刈穫食貨志云 力耕數耘收穫如賊盜之至故熟須刈乾
須積刈早則傷鎌刈晚則拆穗遇風則收減濕積則稿
爛積晚則粒耗連雨則生耳所以收穫不司殺也

本性稷味淡而氣微寒養腎益氣和五臟通氣血壯顏色
陳者可益壽 北人常食日用不可離者淮水治霍亂吐
酸水洗皮膚瘙痒煮穉皮治小兒疳利粟糠和藥可薰
痔漏穉奴利小腹除煩熱

効方日錄王季 馮道嘗診脈云三年死求于日者亦如言

又卜之匪吉一日獨步圯間遇一士相語甚投道以實
 告士曰我有接命術可能行乎先于地掘一穴本蓋土
 填留竅得三十年稷米為飯食併去五味如是于日自
 可免死道如其言至于卜之死口竟無事又延百日出
 形反少人聞而求其故曰得異人如是方也



周禮地官曰舍人掌粟人之藏許曰九穀俱藏為王
 粟弗能守也○管子金粟云野與市爭民金與粟爭
 貴又曰曰諸侯之國也故粟五釜而緡金○而子且金生而
 侯山東之國也故粟五釜而緡金○而子且金生而
 粟死粟死而金生金一兩生于境內粟十石生于
 境內粟十石生于境內金一兩生于境內粟十石生于
 手境內則金粟而死倉府兩虛好生粟于境內則金
 粟雨生倉府兩虛好生粟于境內則金粟雨生倉府
 而莖殺其粟圓而薄糠其米多沃而食強若此則本
 風先時者莖葉帶苦而以恒衡種之而力奪稻米不
 香後當者莖葉帶苦而太衡種之而青零多相而不

補○魯論孔子與原憲栗憲貧清自守辨而不
受孔子云何不以粟與鄰里鄉黨何以辭爲

秬

秬字解云稷之稷者爾雅名衆唐本草以稷糯者爲秬篆
文象禾體柔弱形故稱秬爲糯是也北方以此釀酒而汗
少于粘黍秬則稷之粘者有赤白黃三色可熬饌可餐饌
半稷半粘者謂其甚良

植秬耕耜及種鋤收穫與稷同

本性秬味甘而氣微寒釀酒則熱若常食撻五臟動風逆
悶人小兒不宜多食同鷄鴨肉食或與粳食成癥癖
秬者肺之穀也故能去寒熱利大腸大腸者肺之舍而
肺多作皮毛熱也

黍

音書陶淵明作歸去來

明為彭澤令不為五斗粟而折腰掛冠歸隱種秫釀酒以自飲嘗言五六月北窓不

卧遇涼風

管半自謂義皇上人○世說種放隱居南

山豹林谷

學行高古性頗嗜酒耕種秫以自釀所

居有林泉

之勝真完召至闕同辭還

山每飲酒

曰空山清寂聊以養和

黍

黍苗似蘆高三四尺結子成枝而疎散外有薄壳如稷子

而光滑有粘不黏色有紅黃黑白米似黃米而稍大惟黑

者今祭禮以為稷說文云黍者暑也當暑而生暑盡而穫

六書精蘊云黍從下黍象子散垂之形故其名不一亦曰

𥽿白曰芭黑曰秬又一稭二米曰秬閩西人呼為糜葉北

人呼為緊江淮人呼為黍楚人以蘆葉裹成稷謂黍角五

日祭三閭之遺製又秬也一亩則黍之為酒尚矣今古以

黍稷之類而不能再核者由于指稷爲粟穀而五穀六穀九穀之中又添一穀如算法之實位添一子棄除不准任位去二子而因歸不合以粟穀爲稷而梁得梁之實黍得黍之實矣律呂議古之定律者以上黨秬黍之中累之以生律度量後人取黍定之終不協律或云秬乃黍之中一秬三米之黍也比黍得天地中和之氣而生蓋不常有有則一種百同一米粒並均勻無大小故可定律他黍則不然古人先得黃種而後度之以黍不足則易之以大有鮮則易之以小約九十黍之辰中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已非律生于黍也欲求律者亦求之於聲氣之元而毋必之秬黍則得矣

植藝宜高潤土耕耨極熟或淺耨點在地宜之三月種

五月熟四月種者七月熟五月種者八月熟但稷苗大

而黍小宜較秬頗稠熟即刈後趁潔即打則稗易

脫退則擇着粒則難脫白者亞于稷赤者多粘正黍人

之稱糜者

本性黍味甘氣微寒不粘者可食粘者久食生熱發痼疾

昏五臟令人好睡人勑絕血小兒多食令人不能行齒

犬食之足踡屈孫思邈云黍乃肺之穀也肺病宜之不

可合蜜及葵同食醉臥種莖令人生癰

効五月令至三月三日黍粳和菜作羹飯可辟疫氣

黍土制唐人春陽月夏陽麥休舊黍冬陽種非以明春
以魚黍以豚脂以膚脂者平也。朝于黍子為即今

魯起象房長壽子路以爲粟之類不飲粟作酒飲之
之孔子使子貢問其爲粟之目曰曾見有氏子爲之
○晏子北郭野見晏子曰吾母老不能食食之
養女子即分食粟府金以遺之駭問人西義場
王無功在河者明自課順黍春伏人西義場
草口供服食養性遊北山東皇若書自號曰東皇子

梁

梁狀如蘆而內實葉亦似蘆莖粗高丈穗大如帚粒若椒

米紅黑色米性堅實種有粘不粘色有黃青白赤粘者可

釀酒可造餠可饅不粘者可造麪可脩水可粥餉者甚良

莖可織笥編簾夾籬供輿稍可笊帚壳可染酒廣雅云禾

稷輝雅云蘆稌一名荻梁一名蘆粟一名稻黍一名蜀稷

一名高粱因形稷黍故有多名也考周禮六穀九穀有粱

無粱可知粱乃陸穀之總名矣自漢以後始以大而芒長

者爲梁小而芒短爲粟今則久通呼爲粟而梁之名隱矣
今穗粟之古長大穗粗粒而有紅白黃毛者皆梁也這志
石解梁員梁遼東有亦梁其異有黃梁楚襄有竹節青梁
江東有自一漢書有梁粒圓形小祀者稷用誤矣

植藝種不宜旱濕地二月種者爲早三月種者爲晚早得
于多晚得于少種或漫種點苗生三四寸鋤一遍五六
寸鋤一遍七八寸再鋤以壅根留強者去弱者並者相
去尺餘一株諺云苗稀穗大子圓粒堅苗及尺餘再耘
耨且耐旱不畏風雨博物志種蜀黍年久生蛇梁乃動
禾也蓋風雨蜀黍山山多風雨故以宜種之地曰蜀黍
刈種種時不宜過老須粒帶嫩嫩四五月黃收之造米不

糙米淘淨味先刈其槌槌束爲把架高棚待乾鼓子晒
乾入財

本性梁味甘氣微寒白梁和中生津青梁益氣補中黃梁
益脾養胃諸梁宜入爲飯甚佳乃穀之美者

効方玉符經云青梁米一斗赤石脂三斤水漬置煖處一
二日土青白衣埋四九如李大服三九不饑

孟詵云青梁米以苦酒浸三日百蒸百晒藏之遠行一
殮可度百日若重殮之四百九十日不饑

九月九日取梁根名龍瓜陰乾燒存性治產難橫生酒
調一錢

粟 曰覽得時之未與時之稼約莖相若稱之得時者重
粟之多量粟相若而春之得時者多米量米相若而

食之得時者刁。飢楚故得十之珠其臭其味皆其
氣草百口食之耳自聰明心意厭智四備交強烟氣
不入身無苛效。○東坡稼說蓋嘗觀夫富人稼乎其
田美而多其食足而有餘其田美而多則可以更保
而地力得完其食足而有餘則種之常不後十而歲
之常及其熟故富人之稼常美少稅而多實久歲而
不腐今十口之家而供百畝之用寸寸而取之日夜
以望之鋤耨經艾相尋以上者如魚鱗而地竭種之
常不及時而魚之常不及熟此豈得復有美珠哉。○
列子窮有餓色客有言于鄭子陽者曰列禦寇有道
之士也居貧自而窮母乃不好土乎鄭子陽遣之栗
列子再拜而辭使有列子人其妻罕而附心且問有
道者妻子皆逸樂今有餓色矣君過而遣先生栗先
生又弗愛豈非命哉列子笑而未之曰君非知我也
以人言而栗正其罪我也且以人之言此吾所以不
受也其後民作難殺陽子列子曰受人之養而不死
其難不義若死其難則死無道也死無道逆也降不
義去逆也豈不遠哉。○沈存中枕中記開元中呂翁
經邱陽有盧生同止王人方蒸黃梁翁取囊中枕
以授盧生曰枕此當適如意生但記身向枕穴中未
幾登第高魁人出出將若龍尊卑散民樂且而妻
賢妾親子孝孫肖奴婢隸實四四如意常無纖慮享

年五土榮盛無比一夕卒遂悟
時呂翁在偏問諸黃梁猶未熟

和

秬形與稻同種出本異猶桑之荆魯禽之鷄鴨也乃時穀
之屬山產之禾也故字從山蔡與稻同但粗長實與稻同
但長糙米有赤白爲飯香美釀酒濃醱可熬糖可炒米山
原之地皆可種之早種早熟晚種晚熟六十日可獲水原
頗少陸地古濕者皆可種此穀中之至美者

秬藝耕耜上熟每秬二升得糞五石每畝三升量地着子
宜稀稠得所每科以不過五六粒多則苗結難發少恐
子生不齊苗生宜密耨至三四寸時耨之六七寸又耨
尺餘再耨耨不厭多耨則子圓實堅苗中去其稗梯

壅其叢根禾將穰時天若少旱引水灌之卽去毋久
停茂而美○又注耨以肥土耕耨極熟治區下種苗生
去草待生五六寸就土掘爲叢分一科移他田中栽之
相去五六寸一科每科以水飲苗甦卽耨或以糞水澆
之多耨爲準此法爲麥地菜地恐遲而設若此治之實
美而佳亦那田就空之法耳或山或平皆宜

刈穫秬子難脫宜先刈其穗收歸緩敲如穫粟法如路遠
刈向田中留七八日日晒夜露可打可并但耗損耳

本性秬味甘氣溫溫中益氣天生五穀所以養人得之則
生不得則死惟此穀得天地中神之氣有造化生育之
功非他穀可比故人藁在所畧耳

將酒醉拌蒸米暮浸日晒以醉盡為度將新淨鑽米
熟蒸與晒乾先以糯米三斗造酒酒熟取酒
每用以一掃涼水吞之可飽一日飲食任意

移
宋去歲意不三秋乃美穀其利生民止原可種違使就
閩取其種三萬斛分給諸道種使民種之○吳越春
秋誘與云春種八穀夏長而養秋成而聚冬蓄而藏
夫天有地而生而不收種一死也夏長無苗二死也
秋成無粟三死也冬藏無蓄四死也雖有堯舜之德
無如之何○東海郭母葬于山無天穢米于地羣鳥
爭食數數如此烏聞哭聲莫不慟焉委因
得於明閭役後執其實乃傷孝子也

移苗葉似黍抽莖三稜穗若粟而分歧狀如鴈瓜粒如黍
實而細茶褐色桴其薄可米可麪可釀酒可煎飴荒年可

濟饑餓飼牛馬甚良

稗

降稗禾中之界者故字從界葉莖穗如黍耐旱少虫患稗
薄紫褐色粒黃而圓如黍粒可米可麴可釀酒可熬餬糠
年可濟饑冬月可飼畜五穀不成不如稗稗蒔之以備荒
年宋史云曹彬有芳蒨精稗之稱

植蒔春耕熟土三月內或漫或點或山或平地皆可蒔苗
生耘耨草盡淨至三青七黃則刈敲

本性穠味甘氣寒健脾胃開弘景云烏稗可代糧汁發

地所刈皆死

蜀光記

蜀光記述流賊兵內民逃遁山來宮居按食一也得
活者不過數人及太平山出時忠氣惟稗生殺民人

而食口救荒說唐大德間西京陷五穀大耗民饑
亡出中竹族花結實飽民果之春米而食以活人民
今五穀種而不加勤獲而不
知富豐年受饑凶年饑死

薏苡

慧苡園經云葉如黍莖高六七尺夏末抽莖莖節傷生枝
枝稍開花結實色青白下圓上尖散顆零落如小豆大有
稷穉之別舂米爲飯甘美可釀酒一名芭薏一名解蠱其
葉似蠱食而解散又似芭黍之苗故有解蠱芭薏之名一
名薏米乃堅硬有薏強之義一名星莢苗初生蓬蒿赤黑
也救荒本草云回回穀西番黍始白漢馬伏波征交尉節
之載入中國薏苡白也苡者車前葉也合二草之美故名
之

置執慧苳勁禾也宜山地種與高粱苞麥同其耘治候熟
收實刈枯留根次年宿根復苗結實但苗弱子稀不若
另種者佳

本性薺苳味甘氣微寒益脾潤肺清熱勝濕炊飯作麵食
之良根能殺虫利水至者忌食

効方虢虫久不除者以幹取甘糜食之可効



漢書烏援征交趾衆士卒皆病甚憂之遊于世間遇
老示一黃而歸幸土病者服之願愈深奇之詢其
土人各著黃以服其言則強壯
耐飢載人中華而播基之

豆

豆圖經云莢高二二尺葉圓而有尖色青上有毛一本分
枝枝至秋開小花有白有些紫成簇結莢長十餘分者三四

豆少者一二粒實滿莢充箕蒼穽脫乃獲種有早中晚形
有大小圓扁色有黃曰赤黑斑褐可醬可豉可腐可芽可
筆油可炒果爲餚未其製用甚多角名莢葉名藿莖名箕
實名豆釋名曰未俗作菽菽乃莢殼之總名篆文未象莢
生附莖垂下之形豆象子在莢中之形廣雅大豆菽小豆
荅州錄云始生泰山平澤其葉可收以飼豕牲其莢壳可
以喂牛馬其實可以炊飲食

白步宜下步所宜先以諸豆平量盛甕內冬至日埋陰地
後十五日發取量之取最多者種之大豆保步易得可
以備凶年小豆不保步而難得也

植菽種宜芒種前後太早則葉盛太遲則苗弱漫種難

耘耨而結莢多點種易於耘耨而實粒圓點種者每科相去八九寸許每穴只宜二三粒多則苗不秀有芽種者有區種者肥地宜稀薄地宜密早種宜稀晚種宜密月內有三卯宜豆忌種西南風申酉日

鋤豆苗生開毛葉兩瓣卽耨一遍易長且短草苗生西五寸鋤一遍壅其根苗七八寸鋤一遍葉衛足耐旱開花時又壅勿以無草而止鋤耨農訣曰豆耘開花子園滿莢若秋雨淋霑葉繁起蔓其苗或蓬或倒難花難實急刈其豆之嫩顛掐其蕃葉令日蕪風透不致沍傷種書云夏至種豆不用壅耕豆花憎見日則黃爛而焦收穫宜葉落莢枯乃穫宜五六株一束收扛高架如種

形縱級排列任其遲早敲之且鮮美不蠹

藏則穀之難久持貯者惟豆易于腐蛀皆因湯滯而生宜晒不宜大日遇大日則皮碎膚裂宜半陰半晴晒之不時翻攪令乾收貯免蛀汚

本性豆味甘氣溫益氣和中久服令人身重或炒熟或者熟性涼造豉性極冷作醬生卷性平半食之溢馬食之涼一休之中數變炒豆同猪肉食壅氣致死小兒忌之十步者無妨服藁麻子及厚朴者並忌食炒豆犯之瘡効方張子辟穀方黑豆五斗揀淘淨蒸三遍晒干去皮利麻子三升浸蒸三遍去皮并研末糯米三斗煮和搗爲劑若拳大人孰蒸一宿服之至飽如渴飲麻子水之麻

湯亦可勿食一切一博物志云救荒取大豆調芡生熟按合光暖徹豆內先日不食以冷水蠅服訖一切魚肉蔬食不得復食渴飲凉水初小困十日後体方强健不思食漢左慈方

劉景先辟穀方大豆五升淘淨蒸三遍去皮大麻子一升浸一宿蒸三遍令開口取仁各搗末水和成團如拳大入甑內蒸從戌至子止寅出甑曬乾若服以飽爲度毋食一切物第一頓飽七日第二頓四十九日第三頓三百日第四頓永不飢不住老少令人强健容貌紅白永不憔悴渴研大麻子湯飲之更轉滋潤臟腑若欲重食物用葵子三合研末煎湯冷服取下藥物如金匱經

食物 甄權云每食後摩肚豆吞三十粒令人長生初
食似覺身重一年以後似覺身輕又益陽 李守愚每
晨以共花水吞黑豆三十五粒謂之五粒穀至老視聽
強 陶華以鹽水煮黑豆常食之能補腎益乃腎家之
穀其形類引之以鹽所以妙也



呂氏春秋云得時之豆長莖短足其莢二七為勝多
枝數節莢葉繁實人菽則圓小菽則博以芳稱之垂
食之息以香如此者不虫先時者必長蔓浮葉蔬節
後時者短莖蔬節木虛不實○魏書曹不即位召其
弟植曰問子有七步才為我吟之植未及七口煮豆
燃豆箕豆在釜中泣本是同根生將心何太急

小豆

小豆圖經云苗高尺餘許葉本圓而未尖並生三葉一枯
上有微毛秋開小花黃白結角一二寸內包實七八粒有

紅白綠黃數種實按藟豆而大可糜食可炒食可爲餅可
泡爲粉作索盪井可飼畜濟民之要穀也董仲舒云菽是
大豆有二種荅是小豆有三種今之赤豆藟豆豈豆白豆
皆小豆屬也本草云繁小而赤黯者入藥其餘不堪入藥
洵洛多種之凡種土中頂尖而生者菽也人豆也種土中
留尖而生者荅也小豆也小者言稞粒之細也雖曰菽穀
其種各族小豆不能保發而難得也

種菽種宜夏至前後太遲則苗難長易生草艱于耘耔又
恐霜臨月溲不及結實種太早則葉繁牽葛鬱泥不花
不能結實土不宜肥耕不宜深宜點種芽葛鬱泥不花
秋雨林勞草長准除苗出二三寸鋤一次土其弱者又

者每科只留一株四五寸又鋤七八寸新芽欲發使風搖

收種待藥落莢枯三青七黃時拔而收之架棚日曬乾破
實箕可飼畜桔可然火

本性小豆味甘氣涼調中養臟合魚酢食成消渴作醬同
飯食生口瘡人食之足重驢食之足輕卒時珍云形小
色赤者乃心之穀也其性下行入陰分通小水澀可止
小水若麻黃能發汗根又止汗物理之異如此

効方五行書云朔旦十五日用赤小豆十四粒麻子七粒
投井中可辟疫又云五月初七日新布囊赤小豆置井
中三日取出男吞七粒女吞十四粒竟年不病元旦面

東以薤水吞赤小豆三七粒 年無諸病立秋日而東
 以井水吞赤小豆七粒 一秋不準痢 時記云十二月
 二十五日夜煮赤小豆粥 一家人小食之在外之人以
 留其分俟其歸食謂之 驅疫粥 婦經止而忽又來因
 房事所觸名曰漏胎用 赤小豆芽為末水調方寸匕日

而止



步時記共王氏有不肖子冬至日死為疫鬼畏赤小
 豆故後人于是作赤小豆粥以厭之○漢楊擇自書
 示曰家作苦夢時伏人能為秦志酒後耳熱附山而呼鳥鳥其詩曰田彼
 南山燕移不治我一坵且落而為箕人生有樂耳須富貴何為

菜豆

藥豆 國經云苗高尺餘許 藥青小而白毛秋開小白花

莢長二三寸嫩青老黑較赤小豆莢微小有色鮮粒大者
皮薄粉多者有色暗粒小者皮厚粉少可作粥飯可釀酒可
造粉爲餅蒸餅湯皮作索爲食中美物生白芽爲蔬中佳
品可飼牲畜肥不生外症乃蒸之類留實生也原古以色
命名曰綠豆今人以菉書也一名植豆義取其栽之宜種
者也

種莢時宜薄田不宜太旱不宜太遲漫種者恐荒于草點
種者恐鬱于科其年李不旺此豆有牧又忌烈日下種
刈麻後植早種者爲摘菉旋熟旋摘其莢遲種者爲拔
菉待齊黃熟拔歸敲

本性菉豆味甘氣寒
迎皮解毒却熱忌杏仁及梔子壳合

魚酢食令人肝黃成渴病

効方一切暑熱煩燥

無效

集異錄一士貧以爲異求卜卜

飛集其首而鳴者曰飛集其老而遺步昔朱斤

除中書即時有飛集其老而遺步昔朱斤之兆今羽必發後果應

豌豆

豌豆圖經云蔓生有

須葉如紫黎兩兩相對開花如飛蝶

狀亦有淡紫者亦有

白者生莢寸餘許子如葉九梧子大

有六七粒及八者嫩

青老黃實紫斑色收子可炒食可造

粉可爲麪粒可入時

餠生馬甚強實可喂畜爾雅翼云成

藏月令云華豆千金

方青小豆別錄云青斑豆臘豆綠豆

通志云回陽豆種出

大宛釋名胡豆今以雜豆所爲胡豆

其苗葉與豌豆同經霜雪固得其名而製
之其法可以藏以備荒白豌豆葉與花同狀但形
則大花葉較俱白者曰未有今種出西域粒狀若大豆色
白而圓其脰帶黑葉可茹莢可煮食子可炒食可爲粉製
素片同豌豆造用亦同


種莢八九月漫種熟地中或種稻地或種豆地中春種
水溉茂臨夏莢老莢枯耨種穀實晒乾收貯

本性豌豆味甘氣平調藥衛益中氣多食發氣癰腫目云
豌豆屬土故其所主病多脾胃元人飲膳每用此豆去
皮同羊肉治食補中益氣

効方痘丁紫黑壤具說有黑線此爲險症豌豆四十九粒

燒存性童髮灰三分珍珠十四粒研末以胭脂為膏先

以新針破丁用口噀去惡血以膏少許點之即紅活目

宋書出忠政常曰我有一馬日食豆草一石終日升

報凡事有
其量也

蠶豆

蠶豆圖經云右華中空葉狀如皂本國未久而深青也

青柔序一枝五葉三叶開花如蝶紫白色結若連綴如大

豆頗似蚕形莢青老則變黃黃如枯葉其中暗不滿

所若四方亦有赤色者可煮食炒食可為麪粉饅牛馬

莢壯苗可肥田結可然為灰可備藥莢狀若老蚕形故名

蠶豆王桢云謂其始孰故令之天平御覽云漢使張騫得

種豆如豆有此豆也

植莖秋八月種潤濕地或于九月點刈種莖中或挖穴點

子以蠶蓋之五月收實與蚕同收

本性蠶豆味甘氣平快中和胃葉可醒酒

効方凡手足背生瘡年久難瘥者口嚼蚕豆敷妙

蜀荒記二人負豆避山中一人負金避山中負豆者

而死其人得金者無食

生復負金去

彬豆

彬豆形小粒細形如野翹搖狀莢長五六寸蕃密甚多粒似茄米而微大每莢一二粒苗高五六寸名彬取其象義也此方產之穀西北多時以爲粥食生芽作蔬蔓可飼畜

三日
三
喂牛馬甚良

植蕓春種秋收惟土廣處可蒔果桑園空落土亦宜植宜
陸土耕熟或耨種或漫種苗生鋤草淨至莢老蔓枯獲
本性彬豆味甘氣溫潤膚快肌開胃寬腸

効方凡小便赤黃不利者煮粥食

廣記秦修霸橋一鄉老助彬豆三百石與工匠爲粥
監修者咸以爲誰不明日盡皆黑駒運至而完其數

服

拔山豆

拔山豆宜種山坡地故名拔山豈引蔓乃荅屬也苗葉如
飯豆形畧同而色淡綠蔓長如豇豆結莢如菡豆實比菡
豆而畧長得色點綠可甑可粥可煮食飼畜甚良

植藟春種肥熟地宜夕苗生棚候莢老莢若肥田者不必
耨至伏中開花結莢犁翻甚干垂矢可種莢麥麥留飼
牲者亦不必去草隨草滋茂于熟收割喂之甚佳

本性拔山豆味甘氣涼行血下氣乍食令人脹滿



明紀天飢流賊亂民逃匿山中負豆充飢遺之明年
小人采其莢煮食之豐年乃至賤之豆凶年爲可珍

之穀也

泥豆

泥豆毒植泥中菱豆之類乃菽之屬因其性而得名藥似
稍豆形若小豆不堪旱植多萌早稻田中子若小黃豆大
土黃色亦有灰黑色者可腐可豉可醬可芽飼畜甚良乃
方產之穀

植薺旱稻半黃時漫種田中經一宿放水乾苗二三寸刈
稻留豆苗去水耘耨八九月熟連桔拔收

本性泥豆味甘氣溫下氣通關養腎益脾

有客諸現三農紀稿謂然嘆曰子之書徒災筆墨其
種莠不外齊民要術其栽培不外上稟農書其形性
不外本草綱目其章集不外羣芳空亦猶談性命者
不過劉程朱之蒲輿工文辭者正手拾漢史之贅牙
又何奇觀子乃農夫無廣見博聞所缺畧甚多未嘗
審問明辨予唯唯考其稿再三年乃出

稽豆

稽豆苗小葉小形若葛開黃白花結莢實黑最小背小野
生故名鹿豆又名盧豆其苗肥茂故得稽稱農人收而蒔
之名薺豆可蒸食可作粉可肥田每畝炒熟一斗甚于餅
渣發矢亦方產之苗也

植莢三四月種耘耨苗老莢熟種之肥田者花開莢成率
翻泥爛種菜麥倍收

苕子

苕子方產之蔓苗耳留實生芽起蔓小葉排列對生深表
方莖紫花亦有紅白花者牽延遍布結莢寸餘子如蘇子
而大黑麻色不堪食用本草云野豌豆廣雅云天巢菜喜
生原濕地嫩時可茹大者詩疏名薇乃野豌豆之不实者小
者卽蘇東坡所謂元修菜也可采作蔬食可晒乾作羹食
先以酒烹之否則令人心跳頭暈蜀人呼爲苕子取其藥
蔓繁茂之義蜀農植以糞田甚于蚕矢麻渣他處少產乃
方苗也

種粳稻初黃稍時漫撒田中至明年四五月收穫若糞用者花初開犁泥種麻種禾甚壯盛有萍田不起荳苗者以糞拌點之或收種者或拌白豌豆雜種之收穫落子篩之各別初種後苗生忌水臨春時以水飲茂



或問以苗肥田而禾茂實盛有道乎予曰有道矣風也見其形不見其色雷也聞其聲不見其形鹽之手水誰知其盛膠之于墨誰知其膠正所謂空空色色之道人日用在其中而不覺

粳稻

梗與秔同乃稻不粘穀之總名也本草以晚者為粳孰不知晚亦有糯者博物志云粳乃穀之至硬者得漿易化粳者硬也堪作飯粘者糯也堪作酒今之釀酒為糯是矣為飯者乃不粘稻反以呼粘是以粳為粘也北人以粳和穀

人以稻稱穀隨方言謬矣藥似麥先扁而後圓成六
節中空約二尺餘抽莖吐穗散稃尖各分如黃瓜子而皮
有皺糙紋遇午花開壳闊過午花收壳合嫩青老黃而堅
種有冰陸南方上下塗泥多宜水種北方平澤多宜陸種
種有早中晚三等有白黃赤黑各色有大小長短有芒無
芒異族米有堅鬆赤白烏紫大細圓長之殊味有香否軟
硬各別性有寒溫異賦南北稻名不一其形隨水土所化
而苗莖粒米更變春秋匙說云稻之爲籍也含水盛其德
也大陰含水漸能化也

治秧田揀肥腴土於冬開鋤起引水凍過去水則土脈活
春來易治以灰糞水澆之不生虫不長草浸後晒乾種

翻再耕相濃熟方可下秧則子不陷又易生發或以青
草或以灰糞厚鋪于田內會爛治熟方可下種或于冬
間收乾敗葉厚布田中趁日風焚之則土煖而苗茂又
且少莫老農云秧是半年春業農者豈可忽乎

浸種早稻宜清明晚稻宜穀雨粒長色紅雜者不堪佑種
須取粒圓實純者作種簸去稗糲糝半用瓦器盛浸塘
水書浸夜收禁入流水芽若未吐以草蓋之浸三四日
微見白芽如針尖狀令長二三分候天氣晴明攪鬆晾
去水氣宜侵晨水定風和然後下種蓋以草灰至八九
日秧青引水浸之（引令缺水）老農云丑日不下秧

出田秧長三四寸時宜于夜靜點葉草火照遊田畔勝焚

其非熟地致遺塊間以絕後來虫患

耕種田治田之法各處土宜天候不一總不過春暖花開
犁翻耨平或上灰糞或將田中去年秋種苗禾犁翻或
納青草鋪撒田間漚塌至七八日但腐再耕耨者三令
水泥相合

插秧芒種前後三時內插者爲早宜上旬拔秧須輕手拔
出就水洗淨去根上泥擦去稈草須根齊葉順用草束
小把量田畝拔秧用小筐裝負于田勻布乘把後漚水
插之但秧不可久留留久則煩鬱苗難茂田水勿合清
清則土氣洽落苗久不死插須得六莖爲一叢六稈爲
一行宜淺不宜深約離五六寸許是不宜頻那舒手只

插大叢却那一遍逐旋插去務整齊以便耘耨

攪水禾插田曰秧既插田曰禾初插田苗微黃萎至穀口
變青以攪把于禾稈中搜鬆禾根苗易茂取其把斷橫
根則直根下行能盛隨去穉稈

耘插田耨後數日或灰糞或餅渣爲末撒田間細細耘之
近秋放乾水將田渥渥塗謂之煨稻入水候土乾爲
之攔稻然後引水浸田謂之還水直至稻成熟方可去
水若遇天旱急將田鋤一遍勿令開裂候天與雲臆其
有雨遍澆糞水待雨勿令水缺則禾殆不歇

起禾平日收灰于棚中收便溺浸透曰晒乾仍沿爲灰逢
日時晨有露清晨持灰遍撒于苗葉上得雨洗下人禾

正苗田趣

播種已將熟薄田堅而不依肥田便如熟田然
及在日間綜錯宜以竿壓順伏致免麥蓋難刈之患

收穫江淮楚蜀之處稻黃時在田中旋度旋拌熟穀水謂
形四方上濶下狹口寬四尺餘高尺餘名曰拌桶刈稻
隨把鋪田成行過下人執稻幹拌向桶中以筲圍半
或兩人和拌不用筲圍一人束草遇雨亦可刈候晴方
拌亦有用圓桶者一人拌者功緩二人拌者其功速但
子粒難落河洛之處稻熟刈穰束把收刈停厰宇後方
鼓子草復另刈另束江淮收稻上雨下水刈一束架竿
并運歸厰落其子考之四方高卑寒溫各熟不一時各

護不一法有處築塲圍以木爲架者編荆爲門式深丈
許高六七尺十月收稻積其上夜間就內安卧不惟煖
可避寒兼以夜能防盜逢春徐打落其實入倉可以久
留

留種稻熟時選揀穗之佳美粒之圓實與土之得宜者向
田中選摘其稻收刈徐于箕內每穗去頭尾存中間
節胡下勿脫皮又勿過老恐變米易須曬乾淨藏
若可木器內若藏瓦器內則水步難生若溫濕則苗出
尋死老農云肥田不如換種將此色穀種植三季又選
彼色種植八季年年換種易田而植不特稻也諸穀皆
然

粳稷要味日生涼燔熱南人日用之食北人食之皆冷
北方十月收粳天氣寒涼物從氣化故也夫抵南方赤
粳旱粳性熱北方白粳遲粳性涼新者熱陳者良利血
脈益五臟壯筋骨食苽蕒作粥食持精強智常食乾粳
飯合人不噎然南人食麥麵而燥煩北人食稻米而病
冷非穀之不宜人乃人之不宜穀也如南人所是南方
秉離之氣稍午時開花亦火之賦如北人所產北方秉
坎之氣麥子時開花亦水之賦是以物各從類而親也
米泔水清燥涼血和氣血益精神止飢解渴炒米湯益
胃除濕不去火毒令人作渴乾燒灰淋水解毒

効方小兒初生三日應開胃氣碎米濃煎汁如豆許與兒

飲之二七日又可與哺慎不得與雜藥



唐書李百藥七陸能文父與友陸義等其讀徐陵文有刈柳耶之間謂不得其事百藥曰春被耶子籍相枉顯注在相耶答人驚○求語孔也度于陳察七日不食告釋于野人得米一斗顏回仲由炊之有塵墨墮飯中回取而食之子貢以責孔子召曰子曰炊而進飯吾將祭先人焉同曰有塵墨墮飯中置之則不潔棄之則可惜回即食之不可祭也○莊子子與與子桑友霖雨十日子與曰子桑病矣雨久無止遂蓺飯而往

糲和

糲和醴酒之穀也糲者漸熬之總名曾象人在民間之義

字林元糲者粘穀也稭不粘穀也然糲甚類以粘不粘為

異耳周禮有稻人漢有稻田孔子云食夫糲今俗以飯稭

呼粘大失訛矣形苗葉莖穗實與稷稭同但葉微黃不若

稷之青綠實色有赤黃紅白形有大小圓長有芒無芒
米亦有赤白圓長齊民要術云糯有九格雉木大黃馬首
虎皮次色是矣今隨土化水變形殊粒異其名種種稻花
午開暮合得陰之精有至七開七合者日中甚香故農云
穀怕午時風糯者糯也粘者粘也其粘糯可釀酒可爲粢
可雋可飴可炒具造用甚多考周禮以稻爲佳蔬蔬者菜
可如也稻苗乃草難作蔬論亦不知當時稻又屬別蔬物
又不知古文錯訛恐後人誤釋之耳職之者細心加詳考
焉莫于就誤因訛而漫禮予非其職不敢以妄議

植蔬齊民要術云凡下地停處燥堅烙濕則淤泥難治而
易荒堯堦而刈種者殺種尤甚故五六月曠之以

擬大麥如水澇不種九月一轉春種稻萬不失一下地
不問秋夏候水盡地白背時速犁耙耨翻熟二月上
旬種爲上時三月種爲中時四月種爲下時漬種令開
口樓耨揜種之卽再遍耨苗長二寸許耙耨而鋤之鋤
欲速每經一雨輒耙耨苗高尺許四月雨耨之科大如
概者五月間霖雨時分拔而栽之一注水區難于引流
殺水者求水又乾求乾又水至夏則溢至秋則涸法以
黃泥和草爲泥糊取秧八九莖以糊九根聯微乾式入
水不沉不浮以當爲度如是量取之散秧充于水區
中如種秧式令勻近秋水降禾下禾深水沉連土得養
此穗結實與種耨者較

計者四方天地氣候迥異擇其宜者耕之秧田宜肥秧
苗宜稀可以耐旱經老插田易茂倘遇旱過時秧宜植
以大叢若得秋口嚴和則全收逢霪亦得半淮南子云
江水肥而宜稻種稻者蓄陂塘以渚之置提閘以止之
種時先放水十日後曳碌碾于遍地既熟然後下種留
苗生五六寸援而秧莠七八寸則耘之耘畢故水病之
欲秀用水浸之苗既長茂穉拔以去穉秀豐收穫時及
時江南上雨下水收稻又用喬杆築架乃不失遺刈早
則米青而不堅刈晚則子零落而耗傷又恐風雨敗壞
稻之藝穫不得一櫛而言抱朴子云南海普安有稻一
歲九熟西域天竺土溽熱一步四熟拾遺記東有融臯

五穀多良有旬日之稻異物志冬夏再種二統志雷州
十一月下種揚雪耕耘次年四月熟浙江一麥兩種廣
東二插其秧江西稻田中復插其稻荆楚大半兩種栽
蘭雜記新昌有冷田不宜旱禾夏至後始插秧秧成稞
放乾田水經烈日曝土圻裂如碎腐狀更妙至七月盡
八月初得雨纔佳土蘇醒而禾茂若于此時無雨然後
汲水灌漑若日曝未久而逢雨水則苗冷瘦不能充泰
之寧夏三月漫種耘耨畢然後引水溉蜀中旱秧水插
山陰會稽田灌以鹽滷水或壅鹽草灰不則難收寧波
台州近海所禾犯鹵潮則死故作碶堰惟拒之嚴則鹽
禾多用石灰台州用蚌蛤灰得糞則茁茂不實此乃各

方之異

本性糯米味甘氣寒釀酒則熱久食糯米令人身軟小泄
尤食之足曲不能行牛馬食其藁足垂孕婦難為食令
子不利合酒食令人醉難醒小兒病人大宜忌之癰疽
可作飯食為粥食止消渴泔水消鷄鴨毒穢穢藉鞅
去寒濕

効方糯米一升浸一宿炒研為末山藥一兩為末勻和每
用半盞得胡椒末少許入沙糖二匕沸水調服大有
滋補久服煖精此上品方也

雜錄

世說陶淵明為彭澤令忽在二百畝悉令吏種杭稻
妻子固諸種極乃使二百畝種杭五十畝種粳○晉
書孔羣好飲酒嘗書于親舊今年田得七百畝估不
子麴蘗事士丞相謂云卿回為恒飲酒不見酒家覆

蘇布曰月縻縻曰不見糟肉而更堪友○韓子齊桓
公飲酒醉遺其冠恥之三日不朝管仲曰此非有國
者之恥也公何不雪之以政公曰善因養倉賜貧窮
論囹圄出薄罪處二日而歸之曰公胡不復遺地乎
穉

穉苗如稻葉而深綠稻苗葉邊有黍穉光滑而無毛根下
帶紫抽莖初如聖穗老則分散結子如黍茶褐色每斗可
得米三升可米可變救荒書云烏禾爾雅云選言穉者禾
之穉可與伯仲也淮南子云籬先稻熟而農夫耕不以小
利防大獲

稗

稗較疏書云生水田及下濕地苗似黍八月抽莖如粟稷
出穗分散如鴈爪狀內有細子如黍粒而赤其稈甚澁其

以粗粳可米可麴歉年可救荒黔志云穆一名犹爪粟一
名鴨掌粳季時珍亦爲不粘之穀不實之禾孰不知犹爪
者秔也鴨掌者粘也可醅酒可熬糯黔方貴穆而賤稻爲
稻之獲有豐歉苗招虫蠹也范勝之云粳堪水旱時無不
熟又特滋茂良田畝得三三斛

種粳春耕田極熟如下稻秧法亦有旱種者亦如插秧法
但秧宜監而淺惟粳宜深而斜節間生根耨亦如稻同收
獲亦同

本性粳粳米味甘而寒補中益氣

典故

魏武使典農種之頃收三千斛斛得水三四斗釀酒
甚美醲炊飯不減粟米藁一斛可當稻藁二斛宜擇
其結長粒大者種之倘遇水旱宜多種○列女傳名
萊子逃世耕于蒙山楚王親至其門口守園之孤嫗

見先生老萊曰諾妻曰竊聞之居乱世爲人所制能
免于患乎妾不能爲人所制妾而去老萊子隨之隱
山申米草實而食收羽
毛而衣自是終身不見

古詩

張宗法師古詩集

小引

代穀以濟饑者繁矣。有時生者有不時生者。有土產者有不土產者。莫若取諸便年稔則采以佐穀。麥歉則收以濟饑。亦不累于地。又不困乎穀。一舉而兩便。

蔓菁

蔓菁一名蕪菁。一名九英。松一名諸葛菜。爾雅云須薺蕪菁。詩云采葑采菲。毛萇註云葑葑也。孫炎云葑一名蕪菁。方土記云葑葑蔓菁也。楊子雲云蕪菁蔓菁也。陳楚謂之蕪菁。魯謂之蕪菁。西謂之蕪菁。魏趙謂之大芥。皆一物也。根長而

日形若胡荽莖霜後轉軟蒸煮任用稍似芋魁含有膏潤
頗近穀氣莖粗葉大而厚潤夏初起苔開黃花四出如芥
藥渾同靈臺人久食菜蔬無穀氣卽有菜色食蔓獨則否
四時皆可食春食苗夏初食心秋食莖冬食根時二之家
能蒔數百本亦可終歲足蔬子可笨油燃土甚明

心蒔種宜七月初每畝用了二三升法以先薙草雨過卽犁
若無雨先一日灌地令透次日耕作畦種覆土厚一指
得砂土高者爲上故墟壤地尤佳苗出後莖小者爲茹
若不欲移植取次莖出大者令相去尺許若欲移植候
苗長六七寸擇其大者移之光耕熟地作畦起上種莖
苗其上壅土淨虛根大莖常每畝種枳可得五十石

三石可當米一石是一畝可得米十四五石則可三人
卒歲之粟也子陳用鰾鰾油浸之曝乾種可少虫患收
子者常六七月種至四月收若春種者亦即生薑與秋
種者同熟然根小莖稜子少若供食者正月至八月皆
可種凡遇水旱他穀已晚但有隙地即可種之以濟口
食若得地方一尺五寸植一本一步即一十六本每畝
得三千六百本每本得子一合共得子三石六斗比油
菜子可利多二三倍十月終耕出蔓菁根數晒過冬月
蒸熟甘而有味和羊肉煮甚美春生岩爲蔬中上品四
月收子比脂麻易種油煉熟炒摻比麻油香美其子九
蒸九晒爲粉可塗帛

本性蔓菁子味苦氣溫常服利上下氣潤五臟解麪毒令人強健

効方辟穀蔓菁子熟時采之水煎三遍合去苦味曝乾搗末每服二錢鹽水小兒服延年夜可讀書三月三日采蔓菁花陰乾爲末空心井水下 抱朴子方蔓菁子三升煮熟臚乾爲末每晨井花水服方寸匕無所忌服一年能夜視物一預禳時疫立春後遇庚子日煮蔓菁汁合家服之不限多少一年可免時疫

廣志云五臺山深谷居人每歲種三百六十本一日食一本不妨絕粒○後漢書諸葛武侯行兵所止合軍士獨種蔓菁取以煮食之可生飲一也藥得可煮食二也久居則肥以滋民三也幸不合惜田也歸則可得而采五也限可食六也故合田曰武侯諸葛菜

芋

芋圖經云王芝芋者吁也芋魁之狀地輿云蹲鴟若鴨之
蹲生也蜀山之下沃野有蹲鴟至死不饑更記云歲生十
二子閏生十三兒芋屬甚多各種不同而俗呼亦異不過以
水旱備之旱芋山地可植水芋澤田可種葉如荷長而不
圓當心出苗者爲芋頭四面附生者爲芋子秋後掘食之
葉莖亦可茹食惟蜀產者大而圓他土產者形長芋不開
花時開者至秋抽莖開黃花傍有一長蔓護之如牛蒡形
皮上有微毛如鱗次裹之其根可煮可煨可果豐年葉根
可飼豕甚于穀實博物志云閭閻鍋聲則不生芋

植蒔揀肥潤土耕極熟三月內擇壬申壬午壬戌辛巳戊

申庚子辛卯日植將芋芽向上勻種候生三四葉高四五寸至四月移栽芋性畏旱宜近水砂土區深可二三尺許行欲寬可風透木欲深深得根大春宜種夏種難生秋宜壅不壅則瘦鋤宜頻澆宜改霜降宜捩其葉須鋤開根邊土加以肥泥壅根使力回于根則愈肥大范勝之云區方深各三尺下實豆箕尺有五寸以糞著上如箕原一區種五本要勻再以糞上之芋成箕爛皆長二三寸南方多水芋北方多旱芋芋宜二尺一科每畝爲科一千一百六十科收鹽若子每科二斤每畝爲斤三千四百二十斤以救饑數倍于穀

芋宜晨露未乾及雨後耘耨令根傍土虛則茂若對日

五月間苗莖七月在芋四角掘土壅根加以灰糞或土
每元子園大霜後起之冰芋不耘耨但宜常加澆之河
澆

舊曆十月揀根園大長尖者就屋簷下掘坑以泥鋪鋪底
將種下內以草茸蓋之勿令凍爛至來春三月取出理
肥地生芽移栽芋多惡種即田園所植亦須慎擇有極
青色多斑者味最劣有毒芋魁一有小毒若食先以灰
煮後和薑煮次易水者熟可解發麻乃堪食野芋大毒
殺人芋三年不采成莖葉根相似誤食者用土漿解或
豆汁糞清灌之

水陸芋味甘氣平滑寬腸胃充肌膚小兒禁食滯胃氣難

剋化有風疾服風藥者禁食服餌家宜忌為其性滑也
同魚肉者食補中益氣茶苦者殺人

醫說

研荒書理之所至凡草木無有遺者蜀不食芋菜日
一鄉珠為所繁墮地腹欲裂珠行人艸齒破草幹
以傷之就哺靡之長久腹消如故○素書秦破趙遷
卓氏之蜀夫婦皆行諸道處少有餘財爭與更求
近處上陵功惟卓氏曰此地地滋澤吾間派山之下沃
野下有導賜至死不飢乃遠求遷致之臨川即鉞山
鼓鑄述箴習易富至鄰國

諸

諸海人云甘諸南方名番諸本草名朱諸葉青莖赤引蔓
栗本大末圓而尖其根形圓而長末本銳皮赤肉黃白質
理細潤巨者如盃亦有大如瓶者小者如指生啖之氣如
桂花熟聞之臭若薔薇苗撲地傳主一蔓至數十百莖節

節生根一畝種數十石勝煮穀二十倍海人以當穀主
食蒸食煮食煨食可切米晒乾收貯作粥食可磨粉可餵
餌可釀酒其製法甚多蔓可飼牛馬根養猪易長旅根中之
至最者

種莖莖宜高土砂地耕熟以土起畦作壟二三尺以根栽
畝間遇旱汲澆以水遇涝急引瀉水苗蔓延猶加土糞
揅之每生諸根若步逢水害旱災至七八月中氣候不
及種莖五穀卽宜剪藤種諸以救饑至于出蝗爲災惟
諸在土薦食不及縱令莖葉皆盡尚能復生遇蝗信到
時急覆土逼孽蝗去滋生更易天災物害不能爲損耕
宜茅前種苗大糞春分後下種若地非砂土須柴灰和

牛馬糞入土中使土脈散緩與砂土同重耕起要極深
將諸根每段節三四寸長覆上深半寸許每穴相去七
八尺橫二三尺蔓生既茂苗長一丈留二尺作老根餘
剪三節爲一段挿入土中大約二分入土一分留外卽
生隨長隨剪隨種隨生蔓延與原種者不異凡栽須順
栽若倒栽則難生在外者生枝在土者生卵約各節生
根卽從其逆緩處斷之令各成根苗每節可得卵三五
枚三月至八月俱可種但卵有大小八九月始生卵冬
季乃止始生便可食若未須者勿頻掘令居土日漸大
到冬至後須盡掘出不則敗腐矣

用地凡諸三三月種者每株用地方二步有半而卵遍焉

傳計約用諸三十六株四五月種者地方二步而卵滿
焉每畝約六十株六月種者地方一步有半而卵滿焉
每畝約一百六株七月種者地方一步而卵滿焉每畝
約二百四十株八月種者地方三尺以內所得卵小矣
計約九百六十株密疎畧以此準之九月畦種生卵如
著頂如棗核擬種

藏種八月揀近根卵堅實者陰乾以軟草裹之置無風和
煖處勿令水凍乃南土收種之法霜降前取近根藤臍
令乾于竈下掘窖約深尺餘寸先下糠粃三四寸次置
種于內又土加糠粃蓋三四寸以土覆之乃北土收種
之法又法七八月收近根老藤入木筩中至霜降前置

草箭內以稗穉置向陽近火處至春取卵種植各土寒
溫不同須宜其地而藏之可也

本性不諸味甘氣平補虛益損所薯蕷同功初食覺滿久
服則快但忌與醋同食



唐志甘諸生朱產海中人
不業耕稼惟植甘諸秋熟

蒸醢切如米貯以充飢名
諸外客俱牛豕得食以甘

諸若梗粟然飲以甘諸酒
海中人壽永百步綠食甘

諸故耳○閑志洋人自海
外得此種海人以示不令出

洋人取諸髮入汲水宛中
因得渡海分種遂開中耳

○甘諸有十二勝牧人多
一也色赤味甚諸上種中

符為蔓經可也益人與山
蕷同三也過地隨生剪其
竹種今步一莖束步遍山
四也葉蔓明地隨生剪其
風雨不得浸類五也收當
米穀凶年不得災六也可
充邊青七也可釀酒八也
甞久收時屑可旋作餅海
勝用饌蜜九也生熟可食
十也用脂少易滋潤十一
也春夏種初冬收枝葉極
盛單穉不容但須壅土不
容耘穉無妨農工十二也
○上象晉云凡人家有嗜
地但只數尺仰見天日便可
種得石計此救荒第一

義也人不忽諸耳口自述田址下者不宜諸若
之地植豆者少易以種諸諸有幾倍之度
災以比種畝可收數十石數口之家止種一畝
汲水澆灌蝗則用土揜藏一至成熟終步足食